

## CLISMA OPACO CLISMA OPACO A DOPPIO CONTRASTO

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

### Tre giorni prima dell'esame

- Eliminare dalla dieta: pane, pasta, patate, legumi, verdura, frutta, zucchero e grassi.
- Alimenti consigliati: carne ai ferri, pesce bollito, brodo, riso, uova sode e groviera.

### Il giorno prima dell'esame

- ore 8.00 colazione ed assunzione di dodici confetti di Pursennid
- ore 12.00 pranzo leggero
- ore 16.00 15 grammi di solfato di magnesio (una bustina) in un bicchiere d'acqua
- ore 21.00 una tazza di brodo magro di carne

Da questo in poi **diguno assoluto**

**I pazienti con sospetta occlusione intestinale o gravemente defedati devono praticare esclusivamente un clistere d'acqua salata tiepida (2 litri) alle ore 21.00 del giorno precedente l'esame.**

**Aggiornato il 30/12/2013**



Dipartimento di Diagnostica per Immagini *Direttore: Dott. Luca Balzarini*  
Servizio di Radiologia *Diagnostica Responsabile: Dott. Luca Balzarini*  
Servizio di Radiologia Oncologica e Interventistica *Responsabile: Dott. Fabio Romano Lutman*

