HUMANITAS

Preparazione valida per l'Istituto Clinico Humanitas Rozzano

(per Humanitas San Pio X consultare la preparazione presente a pagina 2)

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

NORME DI PREPARAZIONE PER GLI ESAMI

1. TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON MEZZO DI CONTRASTO (TAC)
2. FLEBOGRAFIA

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

Il giorno dell'esame TAC presentarsi a **digiuno da almeno 8 ore** e **portare** in visione **i risultati** dei seguenti esami, **eseguiti da non più di un mese**:

- Glicemia
- AST
- ALT
- IGM
- Rapporto Kappa/Lambda (in alternativa elettroforesi delle proteine)
- Creatinina

Portare con sé gli esami radiologici precedenti e la richiesta medica che definisca l'esame e la relativa indicazione.

HUMANITAS

Preparazione valida per Humanitas San Pio X

(per l'Istituto Clinico Humanitas Rozzano consultare la preparazione presente a pagina 1)

NORME DI PREPARAZIONE

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON MEZZO DI CONTRASTO (TAC)

Il giorno fissato per l'esame presentarsi con:

- Gli esiti dei seguenti esami del sangue: **Creatininemia** e **Azotemia** non anteriore ai 60 giorni
- Digiuno non inferiore alle 6 (sei) ore.
- **Documentazione clinica** (visite specialistiche, descrizione di interventi chirurgici, lettere di dimissione ospedaliera, …) **e Radiologica** (radiografie, ecografie, tomografie computerizzate o Risonanza Magnetica) relative alla problematica in esame.
- **Tessera sanitaria**.
- **Richiesta del Medico** (*con quesito clinico*).

ATTENZIONE

In caso di **terapia medica** o **farmaci salvavita** la terapia **non deve essere sospesa**

- Se è in trattamento con **Metformina**:
  - Il **farmaco** deve essere **sospeso due giorni** prima dell'esame e **due giorni** dopo l'esame
- Se ha avuto precedenti **reazioni** a **mezzo di contrasto iodato** o a **farmaci** (eritema generalizzato, orticaria/angioedema, broncospasmo, ipotensione, anafilassi, reazioni cutanee ritardate):
  - eseguire **visita allergologica** prima di sottoporsi all'esame
- Se è affetto da **asma bronchiale sintomatico**, **orticaria in atto** è preferibile rinviare l'esame fino a stabilizzazione del quadro clinico.
- Se è affetto da **Angioedema ricorrente**, **Mastocitosi, Anafilassi Idiopatica**
  - dovrà recarsi dal suo Medico di Medicina Generale per farsi prescrivere:
    - **Prednisone 50 mg** (1 cp 12 e 2 ore prima dell'esame)
    - **Cetirizina 10 mg** + **Montelukast 10 mg** (1 cp 1 ora prima dell'esame)

- Se ha una **funzionalità renale ridotta** (Creatinina alta – *al di fuori del range di riferimento del Laboratorio presso cui è stato eseguito l'esame*):

  •dovrà recarsi dal suo Medico di Medicina Generale per farsi prescrivere:

  - **Acetilcisteina** (esempio: Fluimucil, 2 cps da 600 mg x 2/die il giorno prima ed il giorno dell'esame)
  - **richiesta** per l'esecuzione della **Creatininemia** da eseguire il giorno stesso dell'esame.

- **Sospendere** la terapia diuretica **il giorno prima** dell'esame **e il giorno stesso dell'esame**.
- **Il giorno dell'esame** dovrà presentarsi **in Radiologia** *1 ora prima dell'esame* **per completare la preparazione.**

In caso di terapia medica o farmaci salvavita la terapia non deve essere sospesa

ATTENZIONE

Si prega cortesemente di segnalare appena possibile eventuali impedimenti che rendessero impossibile l'esecuzione telefonando al numero 02 6951 7801

HUMANITAS

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO

In relazione alla Sua anamnesi positiva per reazione avversa a MdC**, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente** schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1) Prednisone 50 mg/os (*Deltacortene forte* 25 mg 2cp)
13 ore prima, 7 ore prima e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;

2) Omeprazolo 20mg (*Omeprazolo* 20 mg 1 cp)
Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (13 ore prima, 7 ore prima, e un'ora prima dell'esame);

3) Antistaminico [Es.Cetirizina (*Zirtec 1cp*) OPPURE Desclorfeniramina (*Polaramin 1 cp*)]
1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.

***Linee Guida SIRM-SIAAIC**

HUMANITAS

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO
In pazienti con angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica

In relazione alla Sua anamnesi, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1) Prednisone 50 mg/os (*Deltacortene forte* 25 mg 2cp)
12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame;

2) Omeprazolo 20mg (*Omeprazolo* 20 mg 1 cp)
Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame);

3) Antistaminico [Es.Cetirizina (*Zirtec* 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (*Polaramin 1 cp*)]
1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;

4) Montelukast (*Montegen* 10mg 1 cp OPPURE *Singulair* 10mg 1 cp)
Ogni sera a partire da 10 giorni prima dell'esecuzione dell'esame.

***Linee guida SIRM-SIAAIC**