

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

Responsabile: Dott. Giorgio Brambilla

Unità Operativa di Radiologia Diagnostica

Responsabile: Dott. Luca Balzarini

PREPARAZIONE PER RISONANZA DA STRESS CON DOBUTAMINA

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

1. A causa della loro potenziale interferenza con il meccanismo d'azione del farmaco (dobutamina), dovrebbe essere **sospesa la terapia con betabloccanti, Calcio-antagonisti bradicardizzanti** (verapamil – diltiazem) **e con nitrati da almeno 24 ore**. Informi il suo curante di questa sospensione, ed in caso di perplessità, le consigliano di discuterne con il suo Cardiologo di riferimento.

IL GIORNO DELL'ESAME:

2. Presentarsi a **digiuno da almeno sei ore** dall'orario dell'esame.
3. Chieda ad un parente/amico di essere accompagnato per la guida dell'auto dopo l'esame.
4. Non assuma alcolici né consumi bevande contenenti caffeina nelle 4-6 ore prima del test.

**PORTARE CON SÉ GLI ESAMI CARDIOLOGICI E RADIOLOGICI PRECEDENTI,
E LA RICHIESTA MEDICA IN CUI SONO SPECIFICATE LE INDICAZIONI DELL'ESAME.**