

HUMANITAS

Unità Operativa di Pneumologia

NORME DI PREPARAZIONE

TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON METACOLINA (PROVA BRONCODINAMICA)

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

IL GIORNO DELL'ESAME

Presentarti a digiuno da almeno 4 ore.

Astensione dall'assunzione di bevande o alimenti contenenti caffeina o teina nelle 8 ore precedenti l'esame (caffè, cola, tè).

Sospensione dell'eventuale terapia inalatoria antiasmatica:

- Tilade o Lomuspray nelle quarantotto ore precedenti l'esame
- Becotide o Clenil nelle ventiquattro ore precedenti l'esame
- Broncodilatatori (Ventolin, Serevent, Foradil, etc.) nelle dodici ore precedenti l'esame
- Antistaminici (Clarityn, Zirtec, Polaramin) nelle quarantotto ore precedenti l'esame

Qualora il paziente abbia contratto un'infezione a carico delle vie aeree superiori (raffreddore, influenza, sinusite) bisogna attendere almeno 3 settimane dalla guarigione prima di programmare il test.

Per eventuali terapie assunte (capsule, compresse, sciroppi) a causa dell'asma o di altre malattie concomitanti, contattare il Medico di famiglia o specialista per ulteriori informazioni.