

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

NORME DI PREPARAZIONE

- **RMN ADDOME SENZA MEZZO DI CONTRASTO**
- **RMN ADDOME SENZA E CON MEZZO DI CONTRASTO**

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

IL GIORNO DELL'ESAME

Osservare digiuno da 6/8 ore.

I pazienti diabetici devono contattare lo specialista per eventuali variazioni della terapia in atto.

È possibile bere dell'acqua solo nella quantità necessaria per l'assunzione di eventuale terapia farmacologica.

Portare i risultati del seguente esame, eseguito da **non più di 3 mesi**:

- **Creatininemia**

Per i seguenti esami è necessario seguire **ulteriori** attenzioni alla preparazione:

RMN ADDOME INFERIORE O PELVICA

Eeguire un clisma fleet circa 2 ore prima dell'esame.

ENTERO RM - (MORBO DI CROHN)

digiuno da 6/8 ore

COLANGIO RM

digiuno da 6/8 ore

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

ATTENZIONE

I portatori di **pace-maker mr compatibili dotati di certificazione** relativa al device impiantato, possono accedere al servizio prenotazione solo previo accordo.

Il radiologo potrebbe inoltre richiedere di visionare una lastra del torace per escludere la presenza di cateteri abbandonati.

I portatori di pace-maker non compatibili non possono accedere alle sale di risonanza magnetica.

Portare con sé gli esami radiologici precedenti.

Il giorno dell'esame è necessario portare con sé la **prescrizione medica** (rossa, dematerializzata o su carta intestata) e **una fotocopia** della stessa da presentare al personale sanitario.

La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO

In relazione alla Sua anamnesi positiva per reazione avversa a MdC, **Le suggeriamo di sottoporsi al seguente** schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1) Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 25 mg 2cp)

13 ore prima, 7 ore prima e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;

2) Omeprazolo 20mg (Omeprazolo 20 mg 1 cp)

Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (13 ore prima, 7 ore prima, e un'ora prima dell'esame);

3) Antistaminico [Es.Cetirizina (Zirtec 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (Polaramin 1 cp)]

1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.

*Linee Guida SIRM-SIAAIC

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO

In pazienti con angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica

In relazione alla Sua anamnesi, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1) Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 25 mg 2cp)

12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame;

2) Omeprazolo 20mg (Omeprazolo 20 mg 1 cp)

Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame);

3) Antistaminico [Es.Cetirizina (Zirtec 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (Polaramin 1 cp)]

1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;

4) Montelukast (Montegen 10mg 1 cp OPPURE Singulair 10mg 1 cp)

Ogni sera a partire da 10 giorni prima dell'esecuzione dell'esame.

***Linee guida SIRM-SIAAIC**