

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

NORME DI PREPARAZIONE

RMN CARDIACA DA STRESS CON ADENOSINA

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

Non assumere the o caffè nelle 24 ore precedenti l'esame.

IL GIORNO DELL'ESAME

Presentarsi a **digiuno da 6 ore**.

PORTARE:

- Tutta la documentazione cardiologica in vostro possesso, comprensiva di un ECG recente (eseguito entro i 6 mesi precedenti)
- Creatininemia, eseguita da non più di 3 mesi.
- La richiesta medica in cui sia specificata l'indicazione all'esame.

Il giorno dell'esame è necessario portare con sé la **prescrizione medica** (rossa, dematerializzata o su carta intestata) **e una fotocopia** della stessa da presentare al personale sanitario. La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO

In relazione alla Sua anamnesi positiva per reazione avversa a MdC, **Le suggeriamo di sottoporsi al seguente** schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1) Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 25 mg 2cp)

13 ore prima, 7 ore prima e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;

2) Omeprazolo 20mg (Omeprazolo 20 mg 1 cp)

Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (13 ore prima, 7 ore prima, e un'ora prima dell'esame);

3) Antistaminico [Es.Cetirizina (Zirtec 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (Polaramin 1 cp)]

1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.

*Linee Guida SIRM-SIAAIC

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO

In pazienti con angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica

In relazione alla Sua anamnesi, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1) Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 25 mg 2cp)

12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame;

2) Omeprazolo 20mg (Omeprazolo 20 mg 1 cp)

Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione

dell'esame);

3) Antistaminico [Es.Cetirizina (Zirtec 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (Polaramin 1 cp)]

1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;

4) Montelukast (Montegen 10mg 1 cp OPPURE Singulair 10mg 1 cp)

Ogni sera a partire da 10 giorni prima dell'esecuzione dell'esame.

*Linee guida SIRM-SIAAIC