

Unità Operativa di Analisi Cliniche

RACCOLTA DEL LIQUIDO SEMINALE IN CONTENITORE STERILE (SPERMIOCOLTURA) PROCEDURA P9

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

IL GIORNO DELL'ESAME

1. Lavarsi accuratamente le mani e i genitali con acqua e sapone.
2. Raccogliere il primo getto delle urine nel contenitore sterile 1, scartando il resto delle urine.
3. Scoprire il glande per ridurre le possibilità di contaminazione.
4. Raccogliere il liquido seminale nel contenitore sterile 2, facendo attenzione ad aprirlo solo poco prima ed evitare di toccare con le dita o con gli indumenti l'interno del barattolo e il lato inferiore del coperchio.
5. Avvitare accuratamente il coperchio dei contenitori e consegnarli entro due ore dalla raccolta al Punto Prelievi (se richiesto contemporaneamente lo spermioγραμμα i contenitori vanno consegnati entro 1 ora).

NOTA BENE:

Se richiesta l'esecuzione di spermioultura è necessario **astenersi sessualmente nei 3 giorni precedenti** l'esecuzione dei prelievi.

Se richiesto spermioγραμμα e spermioultura, i due esami **non** possono essere eseguiti nella stessa giornata e/o sulla stessa raccolta.

Hanno norme di preparazione differenti e devono essere eseguiti a distanza di almeno 4 giorni l'uno dall'altro.