

HUMANITAS

Unità Operativa di Analisi Cliniche

PROCEDURA PER L'ALLESTIMENTO DEL VETRINO PER LO SCOTCH-TEST PROCEDURA P17

IL GIORNO DELL'ESAME

Indossare guanti e alla fine della operazione lavarsi accuratamente le mani in quanto le uova sono infettanti.

Utilizzare dello scotch assolutamente trasparente non opaco, mono-adesivo e tre vetrini portaoggetti (disponibili gratuitamente presso i Punti Prelievo di Humanitas), come indicato dalla recenti Linee Guida si consiglia di esaminare almeno tre campioni raccolti a giorni alterni dal momento che un singolo Scotch test individua solo il 60% delle infezioni.

La raccolta deve essere eseguita al momento del risveglio mattutino.

La sera precedente, prima di coricarsi, lavare accuratamente la zona anale. Non defecare fino al momento della raccolta.

Appena svegli tamponare lo sfintere anale e la zona circostante con il lato adesivo dello scotch, tenendo il nastro per le due estremità.

Fare aderire il nastro al vetrino portaoggetti ponendo molta attenzione affinché il nastro sul vetrino aderisca perfettamente per tutta la sua lunghezza senza la formazione di pieghe, tagliando le porzioni eccedenti.

Imbustare i tre vetrini preparati e consegnarli al Punto Prelievi.