

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

tranne per Humanitas San Pio X – Preparazione presente a pag.2

tranne per Humanitas Castelli– Preparazione presente a pag.3 e 4

DEFECOGRAFIA

Due ore prima dell'esame, è necessario eseguire un clistere da acquistare in farmacia. Occorre portare con sé gli esami radiologici precedenti.

Il giorno dell'esame è necessario portare con sé la prescrizione medica (rossa, dematerializzata o su carta intestata) e una fotocopia della stessa da presentare al personale sanitario. La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico.

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER HUMANITAS SAN PIO X (Milano)

COLPOCISTODEFECOGRAFIA (O DEFECOGRAFIA) CON STUDIO SERIATO DEL TENUE

La Defecografia è un esame fondamentale per lo studio della sindrome di defecazione ostruita.

L'esame consiste nell'introduzione per via anale di circa 120 cc di pasta baritata semisolida per opacizzare l'ampolla rettale e nella successiva esecuzione di diversi radiogrammi (con il/la paziente seduto/a su di un gabinetto radiotrasparente), sia in fase di riposo, sia di contrazione forzata, sia di spinta addominale, sia durante la fase evacuativa.

Per poter studiare correttamente i rapporti con la vagina (nella donna) e l'intestino tenue (che può interferire con la defecazione, a causa di un eventuale enterocele) occorre opacizzare entrambi: la prima con pasta baritata densa, il secondo mediante l'assunzione di circa 100/150 cc di mezzo di contrasto baritato circa **due ore prima** dell'esame.

La contemporanea opacizzazione della vescica si ottiene mediante introduzione di circa 50 cc di mezzo di contrasto (MdC) iodato mediante sottile catetere.

È indispensabile **eseguire un clistere di pulizia al mattino dell'esame** per rimuovere residui fecali nel retto che ostacolerebbero l'esame.

L'esame comporta un'alta esposizione della regione pelvica a radiazioni ionizzanti (circa 45 mGy) che non è possibile proteggere con schermi piombati gli organi riproduttivi.

È quindi indispensabile che le pazienti in età fertile siano certe di NON essere in stato di gravidanza.

Informazioni

Il giorno dell'esame:

- ✓ Eseguire piccolo microclisma di pulizia la mattina dell'esame, prima di uscire da casa.
- ✓ Presentarsi presso la Radiologia (seminterrato -1) alle ore **8** per bere il mezzo di contrasto orale baritato.
- ✓ Non occorre interrompere eventuali terapie in atto.
- ✓ È possibile mangiare e bere prima e dopo l'assunzione di bario per bocca.
- ✓ Il giorno dell'esame è necessario portare con sé la **prescrizione medica** (rossa, dematerializzata o su carta intestata):

Se femmine per:

- Cistografia 87.77 (698777)
- Colopografia 87.89.1 (6987891)
- Defecografia 87.69.1 (6987691)
- Studio seriato del tenue 87.63 (698763)

Se maschi per:

- Defecografia 87.69.1 (6987691)
- Studio seriato del tenue 87.63 (6987693)

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER HUMANITAS CASTELLI (BERGAMO)

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER L'ESECUZIONE DI PELVIGRAFIA / DEFECOGRAFIA / COLPOCISTODEFECOGRAFIA

- Effettuare un clistere di pulizia prima di partire da casa (Clismalax o Clismafeet da 125-250 ml);
- Presentarsi in accettazione 2h e 30min in anticipo rispetto all'orario dell'appuntamento;
- Il BARIO sarà somministrato circa 1,5 – 2 h prima dell'esame (cisto-colpo-defecografia);
- Dopo l'assunzione del BARIO il paziente sarà libero di muoversi in attesa dell'esame;
- L'esame è eseguibile anche durante il ciclo mestruale;
- Il paziente potrà mangiare sia la sera prima che il giorno stesso, prima e dopo l'assunzione del BARIO.

Particolari indicazioni:

I pazienti che devono eseguire anche altri esami (ad esempio manometria anorettale o ecografia trans-ale a sonda rotante) nella stessa seduta dovranno eseguire il clistere di pulizia nelle 2 ore antecedenti all'appuntamento. Il bario verrà somministrato prima dei suddetti esami. Gli esami saranno eseguiti nel periodo fra l'assunzione del bario e la defecografia / cisto-colpo-defecografia con opacizzazione ileare.

Al **termine** della procedura il paziente potrà nuovamente riprendere tutte le attività e **alimentarsi a piacere**.

È possibile la sensazione di pesantezza addominale dopo l'assunzione del BARIO.
Il BARIO non provoca scariche diarroiche.

Che cos'è la COLPOCISTODEFECOGRAFIA?

La **colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare** (pelvigrafia o defecografia) è un esame radiologico (**poco invasivo**) che permette di valutare la dinamica evacuativa ed evidenziare le alterazioni funzionali e morfologiche a carico degli organi in esame (tenue, retto, vagina e vescica).

A cosa serve la colpocistodefecografia?

La **colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare** è utile per l'individuazione di **prolassi retto-anali**, eventualmente associati a quelli **uterini** e **vescicali**, e per lo studio di malattie funzionali, quali la stipsi, la defecazione ostruita e l'incontinenza fecale.

Come si svolge la colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare?

La **colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare** è un esame indolore, eseguito con una preventiva introduzione di mezzo di contrasto iodato non ionico in vescica, di bario in intestino tenue

Unità Funzionale di Proctologia e Pelvi-perineologia

Responsabile Dott. Agradi Sergio

(assunzione per bocca) e di bario in cavità vaginale e rettale, al fine di renderli visibili all'esame radiologico.

Il **paziente** viene fatto sedere su una sedia di materiale radiotrasparente che consente l'**osservazione radioscopica**.

Nel corso dell'esame viene analizzata la dinamica evacuativa, e le sue alterazioni, e la morfologia degli organi in esami al fine di osservarne eventuali alterazioni per permettere successivamente adeguate valutazioni terapeutiche al chirurgo proctologo.

Durata della colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare:

La colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare dura mediamente **15/20 minuti**.

Controindicazioni della colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare:

Rappresentano controindicazioni all'effettuazione della **colpocistodefecografia** eventuali conosciute **allergie al mezzo di contrasto**, il bario o lo iodio (che devono essere riferite al medico esecutore).

La metodica può essere eseguita anche **in corso del ciclo mestruale**.

La **gravidanza** è senza alcun dubbio una **controindicazione assoluta** all'esecuzione dell'esame ed il solo sospetto **deve** essere comunicato agli operatori sanitari.

Il referto sarà disponibile dopo 4 giorni lavorativi dalla data dell'esame; il ritiro si potrà effettuare presso il CUP dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:30 o il sabato dalle 9:00 alle 12:30.

Per i pazienti privati il referto sarà disponibile al ritiro dopo le ore 16.00.

In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico 0354204004 (segreteria telefonica sempre attiva).