

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

NORME DI PREPARAZIONE

RISONANZA MAGNETICA ADDOME CON MEZZO DI CONTRASTO

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate

IL GIORNO DELL'ESAME

- Presentarsi a **digiuno da almeno 7 ore**, rispetto all'orario previsto per l'esame (i pazienti diabetici devono contattare lo specialista per eventuali variazioni della terapia)
- Portare in visione i risultati dell'esame ematico CREATININA, eseguito da non più di 3 mesi
- Portare con sé gli esami radiologici precedenti e la documentazione clinica attinenti all'esame in programma
- Portare con sé la prescrizione medica emessa dal proprio medico curante (rossa, dematerializzata o su carta intestata) e una fotocopia della stessa da presentare al personale sanitario. La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico
- In caso esame ENTERO RM – (Morbo di Chron): presentarsi in struttura 2 ore prima dell'orario di esecuzione dell'esame
- In caso di RMN addome inferiore, pelvica o prostatica con contrasto: eseguire un clisma fleet circa 2 ore prima dell'esame

ATTENZIONE

Terapie

In caso di terapia medica in corso i farmaci devono essere assunti secondo schema, senza interrompere la terapia stessa (fa eccezione la terapia insulinica stante il digiuno).

Allergie

A discrezione sua e del suo medico curante, qualora abbia avuto precedenti reazioni a mezzo di contrasto iodato o a farmaci (eritema generalizzato, orticaria/angioedema, broncospasmo, ipotensione, anafilassi, reazioni cutanee ritardate), prima di sottoporsi all'esame può utilmente eseguire una visita allergologica.

Insufficienza renale

Se ha una funzionalità renale ridotta (Creatinina alta o al di fuori del *range* di riferimento del Laboratorio presso cui è stato eseguito l'esame) dovrà:

- consultare il suo medico curante per autorizzare l'esecuzione dell'esame
- effettuare il dosaggio della creatinina il giorno prima dell'esame

Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca

I portatori di dispositivi Pacemaker (PM), Defibrillatori (ICD) e Loop Recorder (ILR) devono prontamente comunicarlo al Servizio Clienti. I portatori di dispositivi compatibili dovranno portare con sé tutta la documentazione sul dispositivo

Trattamento farmacologico per allergia a mezzo di contrasto

Qualora abbia avuto in passato una reazione allergica a MdC (mezzo di contrasto), Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1. Prednisone 50 mg/os (*Deltacortene forte* 25 mg 2 compresse): 13 ore prima, 7 ore prima e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;
2. Antistaminico [ad esempio Cetirizina (*Zirtec* 1 compressa) oppure Desclorfeniramina (*Polaramin* 1 compressa)] 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.

Trattamento farmacologico per pazienti con diatesi allergica

Qualora Lei sia affetto da angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1. Prednisone 50 mg/os (*Deltacortene forte* 25 mg 2 compresse): 12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame;
2. Antistaminico [ad esempio Cetirizina (*Zirtec* 1 compressa) oppure Desclorfeniramina (*Polaramin* 1 compressa)] 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.
3. Montelukast (*Montegen* 10mg 1 compressa OPPURE *Singulair* 10mg 1 compressa) ogni sera a partire da 10 giorni prima dell'esecuzione dell'esame