

HUMANITAS

NORME DI PREPARAZIONE VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

per Humanitas Gavazzeni consultare anche le informazioni presenti a pag. 3

NORME DI PREPARAZIONE

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON MEZZO DI CONTRASTO (TAC) ANGIO TC FLEBOGRAFIA

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

IL GIORNO DELL'ESAME

- Presentarsi a **digiuno da almeno 7 ore**, rispetto all'orario previsto per l'esame (i pazienti diabetici devono contattare lo specialista per eventuali variazioni della terapia)
- Portare in visione i risultati dell'esame ematico CREATININA, eseguito da non più di 3 mesi
- Portare con sé gli esami radiologici precedenti e la documentazione clinica attinenti all'esame in programma
- Portare con sé la prescrizione medica emessa dal proprio medico curante (rossa, dematerializzata o su carta intestata) e una fotocopia della stessa da presentare al personale sanitario. La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico

ATTENZIONE

Gravidanza

L'esame comporta un'esposizione a radiazioni ionizzanti, per cui il solo sospetto di gravidanza deve essere comunicato agli operatori sanitari.

Terapie

In caso di terapia medica in corso i farmaci devono essere assunti secondo schema, senza interrompere la terapia stessa (fa eccezione la terapia insulinica stante il digiuno).

Allergie

A discrezione sua e del suo medico curante, qualora abbia avuto precedenti reazioni a mezzo di contrasto iodato o a farmaci (eritema generalizzato, orticaria/angioedema, broncospasmo, ipotensione, anafilassi, reazioni cutanee ritardate), prima di sottoporsi all'esame può utilmente eseguire una visita allergologica.

Insufficienza renale

Se ha una funzionalità renale ridotta (Creatinina alta o al di fuori del *range* di riferimento del Laboratorio presso cui è stato eseguito l'esame) dovrà:

- consultare il suo medico curante per autorizzare l'esecuzione dell'esame
- effettuare il dosaggio della creatinina il giorno prima dell'esame
- qualora sia in trattamento con Metformina lo dovrà sospendere per due giorni prima dell'esame e riprenderlo due giorni dopo

Trattamento farmacologico per allergia a mezzo di contrasto

Qualora abbia avuto in passato una reazione allergica a MdC (mezzo di contrasto), Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

1. Prednisone 50 mg/os (*Deltacortene forte* 25 mg 2 compresse): 13 ore prima, 7 ore prima e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;
2. Antistaminico [ad esempio Cetirizina (*Zirtec* 1 compressa) oppure Desclorfeniramina (*Polaramin* 1 compressa)] 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.

Trattamento farmacologico per pazienti con diatesi allergica

Qualora Lei sia affetto da angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale:

1. Prednisone 50 mg/os (*Deltacortene forte* 25 mg 2 compresse): 12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame;
2. Antistaminico [ad esempio Cetirizina (*Zirtec* 1 compressa) oppure Desclorfeniramina (*Polaramin* 1 compressa)] 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.
3. Montelukast (*Montegen* 10mg 1 compressa OPPURE *Singulair* 10mg 1 compressa) ogni sera a partire da 10 giorni prima dell'esecuzione dell'esame

HUMANITAS

Norme di Preparazione valide per HUMANITAS GAVAZZENI (Bergamo)

Per il medico di medicina generale

Oggetto: esecuzione TAC CUORE CON E SENZA CONTRASTO

Gentile Collega, Con la presente desideriamo informarti sulle modalità prescrittive in regime di Servizio Sanitario Nazionale dell'esame di cui in oggetto.

La TAC CUORE CON E SENZA CONTRASTO consente di ricostruire l'**anatomia cardiaca e coronarica** e di evidenziare eventuali **stenosi**.

Nel corso dell'esame viene iniettato, in una vena del braccio, un **mezzo di contrasto** a base di **iodio**, per rendere visibili alcune strutture vascolari che non sarebbero diversamente valutabili.

Attraverso questo esame c'è la possibilità di individuare in maniera accurata tutti i **vasi arteriosi** del torace e talora potrà essere completato con l'analisi degli apparati valvolari e dell'aorta in tutte le sue porzioni in previsione di eventuali interventi chirurgici.

Si tratta pertanto di un esame utile sia in fase di **screening o follow up** per la cardiopatia ischemica che per la **pianificazione di procedure** percutanee o chirurgiche successive.

L'esame non richiede la sospensione dell'abituale terapia assunta dal paziente (ed in particolare si raccomanda la prosecuzione della terapia betabloccante).

La modalità prescrittiva prevede che sull'impegnativa sia riportata la seguente dicitura:

87.42.5 - TC CUORE CON E SENZA CONTRASTO

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, porgo distinti saluti.