

HUMANITAS

TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA SPIROMETRIA BASALE E DOPO SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO

NORME DI PREPARAZIONE

VALIDE PER: TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

Informazioni per i pazienti

- Se non diversamente precisato dal medico che ha richiesto l'esame, il paziente deve sospendere la terapia inalatoria antiasmatica se possibile nelle 24 ore prima dell'esecuzione del test
- Si sconsiglia di eseguire l'esame qualora il paziente abbia assunto terapia steroidea orale o sistemica nei 30 giorni precedenti.
- Qualora il paziente abbia contratto un'infezione a carico delle vie aeree superiori (raffreddore, influenza, sinusite) bisogna attendere almeno 3 settimane dalla guarigione prima di programmare il test.
- Per eventuali terapie assunte (capsule, compresse, sciroppi) a causa dell'asma o di altre malattie concomitanti, contattare il proprio Medico di Medicina Generale o specialista per ulteriori informazioni.

IL GIORNO DELL'ESAME

- Astensione completa dal fumo per 12 ore
- Astensione dall'assunzione di bevande o alimenti contenenti caffeina o teina nelle 8 ore precedenti l'esame (caffè, cola, tè)
- Presentarsi a digiuno da almeno 4 ore

Documentazione necessaria il giorno dell'appuntamento

- Tessera sanitaria valida
- Documentazione clinica (esami e visite precedenti inerenti)
- Impegnativa del medico, ove previsto. La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico
- Eventuali certificati di esenzione dal pagamento del ticket sanitario