

TOMOSCINTIGRAFIA ENCEFALO (PET) RECETTORIALE

NORME DI PREPARAZIONE

VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

Informazioni per i pazienti

- Non è necessario osservare il digiuno.
- La sospensione degli analoghi della somatostatina deve essere indicata dal medico curante (in generale per gli analoghi a breve emivita sono sufficienti 24 ore di sospensione, mentre per gli analoghi a lunga emivita si consiglia di attendere 21/30 gg dall'ultima iniezione).

☒ ESECUZIONE

Tempo di permanenza in reparto: circa 2 ore

☒ RADIOPROTEZIONE

Dopo l'esame è opportuno evitare contatti ravvicinati e prolungati con bambini e donne in gravidanza per 4 ore. In caso di allattamento, sospenderlo per 4 ore dalla somministrazione del radiofarmaco.

Si raccomanda inoltre che, al termine dell'esame, il/la paziente rientri direttamente al proprio domicilio, evitando di essere accompagnato da donne in gravidanza e/o da bambini.

Documentazione necessaria il giorno dell'appuntamento

- Tessera sanitaria valida
- Documentazione clinica (esami e visite precedenti inerenti)
- La prescrizione del medico, ove prevista