

TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (G-SPET) DI PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO

NORME DI PREPARAZIONE

VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO HUMANITAS

Informazioni per i pazienti

- Digiuno per almeno 4 ore prima dell'inizio dell'esame (si può bere l'acqua).
- Prima dell'esame, i farmaci cardioattivi dovrebbero essere sospesi, salvo diversa indicazione da parte dello specialista inviante:
 - da almeno 3 ore i nitroderivati a rapida azione
 - da 48 ore i beta-bloccanti, i calcio-antagonisti e i nitrati a lunga durata.
- Raccomandata la sospensione, nelle 24 ore precedenti l'esame, di farmaci ed alimenti contenenti caffeina e derivati xantinici
- Per favorire un'ottima riuscita dell'esame si consiglia di portare con sé un pasto grasso (es. panini farciti, brioches o alimenti ad alto contenuto di grasso).

☒ **ESECUZIONE**

Tempo di permanenza in reparto: circa 5-6 ore

☒ **RADIOPROTEZIONE**

Dopo l'esame è opportuno evitare contatti ravvicinati e prolungati con bambini e donne in gravidanza per 24 ore. In caso di allattamento, sospenderlo per 24 ore dalla somministrazione del radiofarmaco.

Si raccomanda inoltre che, al termine dell'esame, il/la paziente rientri direttamente al proprio domicilio, evitando di essere accompagnato da donne in gravidanza e/o da bambini.

Documentazione necessaria il giorno dell'appuntamento

- Tessera sanitaria valida
- Documentazione clinica (esami e visite precedenti inerenti)
- La prescrizione del medico, ove prevista